



テレミンソフト坐薬2mgを
お使いの方へ


1. 坐剤の取り出し方

- ① ミシン目に
そって、1個分
を切り離します。
- ② 右図の要領で
静かに左右に
開いて坐剤を
取り出します。



2. 挿入の仕方

- ① 坐剤の後部を
ガーゼなどで
つまみ、先端
から肛門に挿
入します。
- ② 中腰になって坐
剤を挿入し、
立ち上がると
簡単に正しい
位置に入ります。



テレミンソフト坐薬2mgを
お使いの方へ


1. 坐剤の取り出し方

- ① ミシン目に
そって、1個分
を切り離します。
- ② 右図の要領で
静かに左右に
開いて坐剤を
取り出します。



2. 挿入の仕方

- ① 坐剤の後部を
ガーゼなどで
つまみ、先端
から肛門に挿
入します。
- ② 中腰になって坐
剤を挿入し、
立ち上がると
簡単に正しい
位置に入ります。



テレミンソフト坐薬2mgを
お使いの方へ


1. 坐剤の取り出し方

- ① ミシン目に
そって、1個分
を切り離します。
- ② 右図の要領で
静かに左右に
開いて坐剤を
取り出します。



2. 挿入の仕方


- ① 坐剤の後部を
ガーゼなどで
つまみ、先端
から肛門に挿
入します。
- ② 中腰になって坐
剤を挿入し、
立ち上がると
簡単に正しい
位置に入ります。



テレミンソフト坐薬2mgを
お使いの方へ

1. 坐剤の取り出し方

- ① ミシン目に
そって、1個分
を切り離します。
- ② 右図の要領で
静かに左右に
開いて坐剤を
取り出します。



2. 挿入の仕方

- ① 坐剤の後部を
ガーゼなどで
つまみ、先端
から肛門に挿
入します。
- ② 中腰になって坐
剤を挿入し、
立ち上がると
簡単に正しい
位置に入ります。



3. 挿入後の注意

- ・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。
- ・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。

4. その他の注意

- ・このお薬は口から飲まないでください。
- ・このお薬は体温で溶けるように設計されています。
- ・冷蔵庫などで凍結をさせて2～8℃で保管してください。使用前には室温に戻してご使用ください。

3. 挿入後の注意

- ・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。
- ・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。

4. その他の注意

- ・このお薬は口から飲まないでください。
- ・このお薬は体温で溶けるように設計されています。
- ・冷蔵庫などで凍結をさせて2～8℃で保管してください。使用前には室温に戻してご使用ください。

3. 挿入後の注意

- ・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。
- ・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。

4. その他の注意

- ・このお薬は口から飲まないでください。
- ・このお薬は体温で溶けるように設計されています。
- ・冷蔵庫などで凍結をさせて2～8℃で保管してください。使用前には室温に戻してご使用ください。

3. 挿入後の注意

- ・挿入直後は異物感が残りますが、しばらくすると異物感はなくなっていきます。
- ・坐剤が外に出ないようにするため、挿入直後は、激しい運動をさけてください。

4. その他の注意

- ・このお薬は口から飲まないでください。
- ・このお薬は体温で溶けるように設計されています。
- ・冷蔵庫などで凍結をさせて2～8℃で保管してください。使用前には室温に戻してご使用ください。