

## くすりのしおり

内服剤  
2015年6月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのため、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：センノシド錠 12 mg 「JD」

主成分：センノシド A・B (Sennoside A・B)  
剤形：淡赤色の錠剤（直径 7.1mm、厚さ 3.9mm）  
シート記載：JD-030、センノシド錠 12 mg 「JD」



### この薬の作用と効果について

大腸内の細菌の作用で腸のぜん動運動を亢進させる物質になり、大腸粘膜を刺激して腸の動きを促進し、排便を促します。

通常、便秘症の治療に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腹痛などの急性腹症、癒れん性便秘、硬結便、低カリウム血症がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は◀ : 医療担当者記入▶
- ・通常、成人は1回1~2錠（主成分として12~24mg）を1日1回就寝前に服用しますが、年齢、症状により適宜増減されます。ひどい便秘の場合は1回4錠（48mg）まで増量されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合飲まないで、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

### 生活上の注意

- ・尿の色が黄褐色または赤色に変わることがありますが心配ありません。

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、腹痛、腹鳴、悪心、嘔吐、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

### 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。