おくすりガイド　（2026 年 9 月作成）

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。
医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調がよくなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。
薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

センノシド錠「トーワ」

一般名：
センノシド A・B（和名） (Sennoside A・B(英名))

販売名	センノシド錠 12mg「トーワ」
形状（製剤写真等）	

1.どんな薬

○この薬は、大腸に働き、腸の動きを活発にすることで、便が出やすくなります。

2.この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

🚫**次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。**

- 過去にセンノシド錠「トーワ」を含む薬で過敏症のあった人
- 急な激しいお腹の痛みがあり、原因がわかっていない人
- 腸がけいれんして起こる便秘と診断された人
- 便が非常に硬くなって腸につまっている人
- 血液中のミネラルのバランスがくずれている人（特に血液の中のカリウムが少ない人）

○**次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。**

- 腹部の手術を受けた後の人
- 妊婦または妊娠している可能性のある人
- 授乳中の人

○他の医療機関にかかる場合や、薬局などで他の薬を買う場合は、必ずこの薬を使用していることを医師や薬剤師に伝えてください。

3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

○この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用など
お腹が痛い	腹痛

○この薬は長期間続けて使用すると効きにくくなったり、薬に頼りがちになることがあるため、長期間続けて使用はしないでください。

○この薬を大量に服用すると、子宮が収縮し、流産や早産につながるおそれがあるため、妊婦または妊娠している可能性のある人は、この薬を大量に服用しないでください。

4.ほかに知られている副作用

「3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較的よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用など
お腹が痛い、水のような便が出る、泥のようなゆるい便が出る	下痢
吐き気、胃がムカムカして気持ち悪い、胃のあたりで焼け付くような感じがする、吐く	悪心・嘔吐
お腹がゴロゴロなる	腹鳴

5.保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6.問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：東和薬品株式会社（https://www.towayakuhin.co.jp/）

電話番号：0120-757-108

発　売：ジェイドルフ製薬株式会社（https://www.j-dolph.co.jp/）

電話番号：06-7507-2532

受付時間：9 時～17 時 30 分（土、日、祝日、その他弊社の休業日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html