

ネリザ坐剤 包装変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、ネリザ坐剤につきまして、下記のとおり包装変更致しますのでご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が市場に流通することとなり、何かとご迷惑をおかけ致しますが、今後とも引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

■ 変更内容

- ① 電子化された添付文書（電子添文）の新記載要領変更の際、薬効表記等について一部記載整備を行いましたので、コンテナ、個装箱についても該当部分を変更します。
※電子添文は既に変更しています。
- ② ロット番号表示を刻印からレーザー印字へ変更します。
- ③ 蓋内側の調剤包装単位用コードのシールの貼付を廃止し、コンテナシートにレーザー印字で直接調剤包装単位 GS1 を表示するように変更します。
- ④ 説明書のサイズならびに同梱枚数を変更します。

	従 来 品	変 更 品																		
コンテナ	 <p>① ② ③</p>	 <p>① ② ③</p>																		
説明書	<p>坐剤の使い方</p> <p>1. 坐剤の取り出し方</p> <p>⑥ ミシン目にそって、1個分を切り離します。</p> <p>⑦ 取り出し口の穴の所を手でつまみ、左右に引っばって坐剤を取り出します。</p> <p>2. 挿入の仕方</p> <p>⑧ ティッシュペーパーなどで坐剤の後部を包んで持ち、先のとがった方から肛門内に挿入します。</p> <p>⑨ 中腰になって坐剤の3/4ほどを入れた後立ち上がれば、簡単に挿入できます。</p> <p>3. 挿入前の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 薬の挿入時間は医師などの指示によりますが、出来るだけ排便後に挿入して下さい。 <p>4. 挿入後の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 挿入後しばらくは異物感が残りますが、がまんして下さい。 ● 坐剤が外に出ないようにするため、挿入後はしばらく運動を避けて下さい。 <p>5. その他の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● この薬は、高温を避けて保管(1~30℃)して下さい。 ● 高温になる所に放置すると、薬が溶けて変形することがあります。 ● この薬は、服用したり、口の中に入れたりしないで下さい。 ● 薬の量は、医師などの指示を正しく守って下さい。 ● この薬は、体温で溶けるようになっていきます。そのため、あぶら様の排泄物が出る場合がありますが、それは薬の基剤ですから心配はいりません。 <p style="text-align: right;">J-1</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>サイズ</td> <td colspan="2">105 × 70mm</td> </tr> <tr> <td>同梱枚数</td> <td>28個</td> <td>2枚</td> </tr> <tr> <td></td> <td>140個</td> <td>10枚 (1冊)</td> </tr> </table>	サイズ	105 × 70mm		同梱枚数	28個	2枚		140個	10枚 (1冊)	<p>坐剤の使い方</p> <p>1. 坐剤の取り出し方</p> <p>⑥ ミシン目にそって、1個分を切り離します。</p> <p>⑦ 取り出し口の穴の所を手でつまみ、左右に引っばって坐剤を取り出します。</p> <p>2. 挿入の仕方</p> <p>⑧ ティッシュペーパーなどで坐剤の後部を包んで持ち、先のとがった方から肛門内に挿入します。</p> <p>⑨ 中腰になって坐剤の3/4ほどを入れた後立ち上がれば、簡単に挿入できます。</p> <p>3. 挿入前の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 薬の挿入時間は医師などの指示によりますが、出来るだけ排便後に挿入して下さい。 <p>4. 挿入後の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 挿入後しばらくは異物感が残りますが、がまんして下さい。 ● 坐剤が外に出ないようにするため、挿入後はしばらく運動を避けて下さい。 <p>5. その他の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● この薬は、高温を避けて保管(1~30℃)して下さい。 ● 高温になる所に放置すると、薬が溶けて変形することがあります。 ● この薬は、服用したり、口の中に入れたりしないで下さい。 ● 薬の量は、医師などの指示を正しく守って下さい。 ● この薬は、体温で溶けるようになっていきます。そのため、あぶら様の排泄物が出る場合がありますが、それは薬の基剤ですから心配はいりません。 <p style="text-align: right;">J-2</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>サイズ</td> <td colspan="2">125 × 50mm</td> </tr> <tr> <td>同梱枚数</td> <td>28個</td> <td>10枚 (1冊)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>140個</td> <td>20枚 (2冊)</td> </tr> </table>	サイズ	125 × 50mm		同梱枚数	28個	10枚 (1冊)		140個	20枚 (2冊)
サイズ	105 × 70mm																			
同梱枚数	28個	2枚																		
	140個	10枚 (1冊)																		
サイズ	125 × 50mm																			
同梱枚数	28個	10枚 (1冊)																		
	140個	20枚 (2冊)																		

